

团体标准

T/CCPIA XXX-2020

呋虫胺颗粒剂

Dinotefuran granules

(征求意见稿)

2020-XX-XX 发布

2020-XX-XX 实施

中国农药工业协会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《文件化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国农药工业协会提出。

本文件由中国农药工业协会归口。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

呋虫胺颗粒剂

1 范围

本文件规定了呋虫胺颗粒剂的要求、试验方法、验收和质量保证期以及标志、标签、包装、储运。本文件适用于由呋虫胺原药、载体及适宜的助剂加工而成的呋虫胺颗粒剂。

注：呋虫胺的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1600—2001 农药水分测定方法

GB/T 1601 农药pH值的测定方法

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药采样方法

GB/T 3796 农药包装通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19136—2003 农药热贮稳定性测定方法

GB/T 30360 颗粒状农药粉尘测定方法

GB/T 33031 农药水分散粒剂耐磨性测定方法

GB/T 33810 农药堆密度测定方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 外观

应为干燥、自由流动的颗粒，无可见的外来物和硬块，基本无粉尘。

4.2 技术指标

呋虫胺颗粒剂还应符合表 1 要求。

表1 呋虫胺颗粒剂控制项目指标

项 目		指 标
呋虫胺质量分数/%		3.0 ^{+0.3} _{-0.3}
水分/% ≤		5.0
pH 范围		5.0~8.0
堆密度	松密度/(g/mL)	0.7~1.3
	实密度/(g/mL)	0.9~1.4
粒度范围(孔径之比为 4:1 的两个标准筛 ^a 之间物)/%		≥ 90
耐磨性/% ≥		90
粉尘		合格
热储稳定性 ^b		合格
^a 标准筛的孔径根据具体产品确定。		
^b 正常生产时, 热储稳定性试验, 每 3 个月至少测定一次。		

5 试验方法

安全提示: 使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有的安全问题。使用者有责任采取适当的的安全和健康措施, 并保证符合国家有关法规的规定。

5.1 一般规定

本文件所用试剂和水, 在没有注明其他要求时, 均指分析纯试剂和 GB/T 6682—2008 中规定的三级水。检验结果的判定按 GB/T 8170—2008 中 4.3.3 的规定执行。

5.2 抽样

按 GB/T 1605—2001 中 5.3.3 的规定进行。用随机数表法确定抽样的包装件; 最终抽样量应不少于 600g。

5.3 鉴别试验

高效液相色谱法: 本鉴别试验可与呋虫胺质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下, 试样溶液中某色谱峰的保留时间与标样溶液中呋虫胺色谱峰的保留时间的相对差值在 1.5% 以内。

5.4 呋虫胺质量分数的测定

5.4.1 方法提要

试样用甲醇溶解, 以甲醇+水为流动相, 使用以 Tc-C₁₈(2)为填料的不锈钢柱和紫外检测器, 在波长 270 nm 下对试样中的呋虫胺进行反相高效液相色谱分离, 外标法定量。

5.4.2 试剂和溶液

甲醇: 色谱纯。

水: 新蒸二次蒸馏水或超纯水。

呋虫胺标样: 已知质量分数, $\omega \geq 99.0\%$ 。

5.4.3 仪器

高效液相色谱仪：具有可变波长紫外检测器。

色谱数据处理机或色谱工作站。

色谱柱：250 mm×4.6 mm（内径）不锈钢柱，内装Tc-C₁₈(2)、5 μm填充物（或具有同等效果的色谱柱）。

过滤器：滤膜孔径约 0.45 μm。

微量进样器：50 μL。

定量进样管：5 μL。

超声波清洗器。

5.4.4 高效液相色谱操作条件

流动相：Ψ（甲醇：水）=25：75，经滤膜过滤，并进行脱气。

流速：1.0 mL/min。


柱温：室温（温差变化应不大于 2 °C）。

检测波长：270 nm。

进样体积：5 μL。

保留时间：呋虫胺约 6.4 min。

上述操作参数是典型的，可根据不同仪器特点对给定的操作条件做适当调整，以期获得最佳效果。典型的呋虫胺颗粒剂高效液相色谱图见图 1。



说明：

1—呋虫胺。

图 1 呋虫胺颗粒剂高效液相色谱图

5.4.5 测定步骤

5.4.5.1 标样溶液的制备

称取 0.05 g（精确至 0.000 1 g）呋虫胺标样于 50 mL 容量瓶中，加入约 40 mL 甲醇，超声波振荡 5 min 使标样溶解，冷却至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀。用移液管移取上述溶液 5 mL 于 50 mL 容量瓶中，甲醇稀释至刻度，摇匀。

5.4.5.2 试样溶液的制备

称取含 0.05 g（精确至 0.000 1 g）呋虫胺的试样于 50 mL 容量瓶中，加入约 40 mL 甲醇，超声波振

荡 5 min 使标样溶解，冷却至室温，用甲醇稀释至刻度，摇匀。用移液管移取上述溶液 5 mL 于 50 mL 容量瓶中，甲醇稀释至刻度，摇匀，过滤。

5.4.5.3 测定

在上述操作条件下，待仪器稳定后，连续注入数针标样溶液，直至相邻两针呋虫胺峰面积相对变化小于 1.2% 后，按照标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液的顺序进行测定。

5.4.5.4 计算

将测得的两针试样溶液以及试样前后两针标样溶液中呋虫胺峰面积分别进行平均。试样中呋虫胺的质量分数按式（1）计算：

$$\omega_1 = \frac{A_2 \times m_1 \times \omega}{A_1 \times m_2} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

ω_1 ——试样中呋虫胺的质量分数，以%表示；

A_2 ——试样溶液中呋虫胺峰面积的平均值；

m_1 ——标样的质量的数值，单位为克（g）；

ω ——标样溶液中呋虫胺的质量分数，以%表示；

A_1 ——标样溶液中呋虫胺峰面积的平均值；

m_2 ——试样的质量的数值，单位为克（g）。

5.4.6 允许差

呋虫胺质量分数两次平行测定结果之差应不大于 0.2%，取其算术平均值作为测定结果。

5.5 水分的测定

按 GB/T 1600—2001 中 2.2 的规定执行。

5.6 pH 值的测定

按 GB/T 1601 的规定执行。

5.7 堆密度的测定

按 GB/T 33810 的规定执行。

5.8 粒度范围的测定

5.8.1 仪器

标准筛组：孔径之比为 4:1 的两个标准筛，并配有筛底和筛盖，标准筛孔径根据样品粒度确定。

振筛机：振幅 36 mm，振荡次数 243 次/min，振荡时间 10 min。

5.8.2 测定步骤

将标准筛上下叠装，大孔径筛置于小孔径筛的上面，筛下装筛底，同时将组合好的筛组固定在振筛机上，称取 100 g（精确至 0.1 g）试样，置于上面筛上，加盖密封，启动振筛机振荡 10 min，收集小孔径筛上物称量。

5.8.3 计算

试样的粒度范围按式（2）计算：

$$\omega_2 = \frac{m_1}{m} \dots\dots\dots (2)$$

式中：

ω_2 ——试样的粒度范围，以%表示；

m_1 ——小孔径筛上物质量，单位为克（g）；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

5.9 耐磨性的测定

按 GB/T 33031 的规定执行。称取 100.0 g（精确至 0.01g）过筛后的颗粒剂样品，加入钢球：15 个（直径 7.94mm）；振筛机振幅：36mm；振荡次数：243 次/min，振荡时间：10min。

5.10 粉尘

按 GB/T 30360 的规定执行，基本无粉尘为合格。

5.11 热储稳定性试验

按 GB/T 19136—2003 中 2.3 的规定执行。热储后，呋虫胺质量分数不低于储前的 95%，pH、粒度范围、耐磨性和粉尘符合文件要求为合格。

6 验收和质量保证期

6.1 验收

应符合 GB/T 1604 的规定。

6.2 质量保证期

在规定的储运条件下，呋虫胺颗粒剂的质量保证期从生产日期算起为 2 年。在质量保证期内，各项指标均应符合文件要求。

7 标志、标签、包装、储运

7.1 标志、标签和包装

呋虫胺颗粒剂的标志、标签和包装，应符合 GB 3796 的规定。

呋虫胺颗粒剂应用清洁、干燥的铝箔袋包装，每袋净含量通常为 200g、500g 或 1000g，外包装为瓦楞纸箱或塑料箱，每箱净含量不超过 10Kg；也可根据用户要求或订货协议，采用其他形式的包装，但要符合 GB 3796 的规定。

7.2 储运

呋虫胺颗粒剂包装件应储存在通风、干燥的库房中。储运时，严防潮湿和日晒，不得与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口鼻吸入。

附 录 A
(资料性附录)

呋虫胺的其它名称、结构式和基本物化参数

本产品有效成分呋虫胺的其他名称、结构式和基本物化参数如下。


中文通用名称：呋虫胺

ISO 通用名称：Dinotefuran。

CAS 登录号：165252-70-0。

化学名称：N-甲基-N'-硝基-N''-[(四氢-3-呋喃)甲基]胍。

结构式：



实验式：C₇H₁₄N₄O₃。

相对分子质量：202.2。

生物活性：杀虫。

熔点：107.5℃。

蒸汽压(30℃)：小于 1.7×10⁻³ mpa。

溶解度 (20℃)：水 39.8g/L、正己烷 9×10⁻⁶g/L、庚烷 11×10⁻⁶g/L、二甲苯 72×10⁻³g/L、甲苯 150×10⁻³g/L、二氯甲烷 61 g/L、丙酮 58 g/L、甲醇 57 g/L、乙醇 19 g/L、乙酸乙酯 5.2 g/L。

稳定性：在 150℃下稳定；水解半衰期大于 1 年 (pH4,7,9)；光解半衰期 3.8h (灭菌/天然水)。